



آزمایشاتی که حتما ادرار ۲۴ ساعته میخواهد

- Catecholamines (برای تشخیص فنوکروموسیتوم جمع‌آوری شبانه ادرار توصیه می‌شود.)
- Citrate
- Cortisol, Free
- Delta(5)-Aminolevulinic Acid (ALA)
- 17-Hydroxycorticosteroids
- 5-HIAA
- Hydroxyproline
- 17-Ketosteroids
- LH
- Magnesium
- Mercury
- Metanephrines
- Protein Electrophoresis
- Protein, Quantitative
- Schilling test
- Transthyretin
- Zn

آزمایشاتی که ترجیحاً نیازمند به ادرار ۲۴ ساعته است

- Calcium ✓
- Creatinine Clearance (استفاده از دو کلیرانس متوالی دو ساعته هم قابل قبول است.) ✓
- Homovanillic Acid (جمع‌آوری‌های کمتر از ۲۴ ساعت هم قابل قبول است.) ✓
- Manganese (ادرار رانوم هم قابل قبول است.) ✓
- Microalbuminuria (از نمونه‌ای که در مدت شب (۱۲ ساعت) جمع‌آوری شده و نیز نمونه رانوم برای تعیین نسبت به کراتینین می‌توان استفاده کرد.) ✓
- Mucopolysaccharides ✓
- Oxalate (غلظت اگزالات ادرار ابتدای صبح هم ممکن است مشابه نمونه ۲۴ ساعته باشد.) ✓
- Pyridinoline ✓
- **نکته:** برای اندازه‌گیری آمیلاز ادرار، نمونه ادرار دو ساعته بدون اضافه کردن نگهدارنده ارجح است.