



آندوسکوپی

کد: GCC-PA-098/03



واحدآموزش همگانی

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

مراقبت های بعد از آندوسکوپی :

≤ تا برگشت رفلکس اوغ زدن (طی یک تا دو ساعت) از خوردن و آشامیدن اجتناب کند تا از آسیب رسانیون غذا یا مایعات به داخل ریه ها پیشگیری شود.

≤ بعد از برگشت رفلکس می توانید از مسکن استفاده کنید.

≤ با محلول آب نمک گرم گلو شستشو داده شود.

≤ در صورت استفاده از داروی آرامبخش حین آندوسکوپی تا برگشت کامل سطح هوشیاری لازم است در تخت استراحت داشته باشید.

≤ هنگامی که فرد کاملاً به هوش آمد، تحت نظر پزشک می تواند غذا بخورد و معمولاً هیچ نوع پرهیز غذایی برای این افراد وجود ندارد،

≤ در صورت استفاده از داروی آرامبخش حین آندوسکوپی تا ۲۴ ساعت از رانندگی و انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند خودداری فرمائید.

منبع:

برونر- سودارث ، بیماری های گوارشی

عوارض آندوسکوپی چیست ؟

به طور کلی انجام آندوسکوپی مشکلی به وجود نمی آورد. اما مانند سایر روش های تشخیص دیگر می تواند عوارضی داشته باشد که عبارتند از:

≤ آسیب به معده، مری

≤ حساسیت نسبت به داروی آرامبخش تزریق شده

≤ عفونت

≤ خونریزی

مراقبت های قبل از آندوسکوپی :

≤ از ساعت ۱۲ شب قبل از انجام آندوسکوپی از خوردن آب پرهیز گردد.

≤ از ساعت ۷ شب قبل از انجام آندوسکوپی یک شام سبک بخورید.

≤ از استعمال سیگار و جویدن آدامس قبل از انجام آندوسکوپی خودداری کنید.

≤ در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد مثل وارفارین، آسپرین پزشک خود را مطلع نمائید.


≤ دندان مصنوعی را قبل از انجام آندوسکوپی از دهان خارج کنید.

≤ مدارک پزشکی شامل آندوسکوپی های قبلی و جواب آزمایشات خود را همراه داشته باشید.

تعریف آندوسکوپي :

آندوسکوپ لوله ای است انعطاف پذیر که به دوربین مجهز است و امکان مشاهده مستقیم مری- معده و مخاط دوازدهه را فراهم می کند.

این وسیله از طریق دهان وارد بدن می شود. هر چند که این روش عوارضی نیز دارد، ولی مزایای آن بیشتر است.



موارد کاربرد آندوسکوپي

- ≤ سوزش سر معده، درد شکم و خونریزی غیر طبیعی
- ≤ تشخیص زخم، پولیپ و توده های دستگاه گوارش فوقانی
- ≤ در موارد کنترل خونریزی و برداشتن پولیپ
- ≤ مواردی که غذا یا جسم خارجی در مری گیر کرده باشد
- ≤ برداشتن سنگ های مجرای مشترک صفراوی، رفع تنگی ها و درمان خونریزی معده و واریس مری

روش کار انجام پروسیجر

- روش انجام این فرآیند به صورتی است که یک لوله قابل انعطاف (مجهز به منبع نور و گیرنده ویدئویی) را از طریق دهان وارد دستگاه گوارش می کنند.
- علاوه بر مشاهده داخلی دستگاه گوارش توسط این روش، امکان نمونه برداری از مخاط نیز وجود دارد. این آزمایش حدوداً ۳۰ دقیقه به طول خواهد انجامید.

مراحل حین آندوسکوپي:

(۱) ابتدا روی تخت دراز خواهید کشید.

≤ در صورتی که نیاز به تزریق داروهای آرامبخش احساس شود، داروی آرامبخش از طریق سرم به شما تزریق می شود.

(۲) در مرحله بعد داروی بی حسی به درون حلق شما اسپری خواهد شد.

≤ این دارو مزه بدی دارد و ممکنست احساس بی حسی و تورم در حلق داشته باشید و توانایی قورت دادن را از بین خواهد برد.

توجه: به هنگام وارد شدن لوله به شکم احساس پری و فشار خواهید کرد.

