


# آسیکلوویر



طبقه دارویی: ضد ویروس

اشکال دارویی: ویال ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم، فرس ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم



## اندیکاسیون

بیماری های ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس:

عفونت های ژنیتال

HSV آنسفالیت

تب خال های پوستی-مخاطی


HSV نوزادان

درمان آبله مرغان

مشکلات بیماران مبتلا به ایدز:

نکروز شبکیه ناشی از آبله مرغان حاد  
پیشگیری از فعال شدن مجدد ویروس هرپس سیمپلکس

## موارد منع مصرف



حساسیت به آسیکلوویر

بارداری

شیردهی

در حال مصرف دیگر داروها:

مقادیر بالای استامینوفن

داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی

تداخلات:



از مصرف همزمان با واکسن آبله مرغان پرهیز شود.

عوارض جانبی



خارش

راش پوستی

تهوع و استفراغ

افزایش آنزیم های کبدی

التهاب و فلبیت در محل تزریق

افزایش BUN و کراتینین

نارسایی حاد کلیه

**موضعی:** التهاب، بثورات و زیکولی و فلبیت در ناحیه تزریق

**سایر عوارض:** درد مفصلی، پیدایش ویروسهای مقاوم (با مصرف طولانی مدت و مکرر).

**توجه:** در صورت بروز حساسیت مفرط یا آنسفالوپاتی، مصرف دارو قطع شود.

**مسمومیت و درمان:**



مصرف بیش از حد دارو به دنبال تزریق وریدی مقادیر سرشار در بیمارانی روی می دهد که وضعیت مایعات بین آنها پیگیری نشده و یا مقادیر زیاد و نامتناسبیاز دارو را از راه تزریقی دریافت می کنند.

به دنبال مصرف مقادیر زیاد آسیکلویر مسمومیت حاد با آن گزارش نشده است.

**شرایط نگهداری**



دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه نگه داری کنید محلول رقیق شده جهت انفوزیون به مدت ۲۴ ساعت قابل استفاده است

## نحوه تجویز

- از تزریق سریع وریدی پرهیز کنید
- مطمئن شوید که مایعات کافی به بدن میرسد
- محلول تزریق از نظر بروز فلجیت مانیتور کنید
- از تزریق عضلانی و زیرجلدی بپرهیزید
- قابل تزریق با نرمال سالین و سرم قندی می باشد

دکتر سید مهدی سجادی جزی