



اطلاعات فارماکولوژی شماره ۴



## ایماتینیب

ایماتینیب را مطابق دستور پزشک مصرف نمایید :

دارو را با یک لیوان بزرگ اب یا همراه غذا مصرف نمایید .

**اگر قادر به بلعیدن قرص نیستید :**

قرص را در یک لیوان اب و یا اب سیب به طور کامل حل کرده و فوراً "همه محتویات لیوان را بنوشید .

- برای اثر بخشی بهتر , دارو را هر روز در زمان معینی مصرف نمایید .

- در صورت مصرف همزمان هر گونه دارو پزشک خود را در جریان بگذارید .

دوز فراموش شده را به محض یادآوری مصرف نمایید .

در صورت مصرف دوز اضافی با یکی از مراکز زیر تماس بگیرید .

\*پزشک معالج

\*مرکز اطلاعات مسمومیت

\*نزدیکترین مرکز اورژانس

هر دارو عتاوه بر اثرات مفید اثرات نا خواسته نیز دارد که در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه یا مشورت با پزشک داشته باشد :

\*کم خونی (رنگ پریدگی ,تنفس سخت , خستگی , ضعف

\*خونریزی (کبودی ,لکه های ارغوانی ,مشاهده ی خون در مدفوع وادرار )

عفونت (تب ,سرفه , دفع ادرار دردناک )

ادم (کاهش ادرار ,افزایش وزن سریع ,ورم دست و پا وصورت )

### مراقبت های لازم طی درمان با ایماتینیب

از مصرف گریب فروت خودداری نمایید .

از مصرف داروهای حاوی استامینوفن خودداری نمایید .

از انجام کارهایی که نیازبه هوشیاری کامل دارد خودداری نمایید .

از قرار گرفتن در معرض نور خورشید به مدت طولانی خودداری نمایید .

در مکان های روباز از پوشش مناسب استفاده نمایید .

در صورت بروز سوختگی های شدید پزشک خود را مطلع نمایید .

### هشدارها و نکات قابل توجه

انجام معاینات و آزمایشات دوره ای در طی مصرف این دارو ضروری است .

در صورت بروز کبودی یا خونریزی شدید با پزشک خود مشورت کنید.

از انجام ورزشهایی که احتمال آسیب و جراحت وجود دارد اجتناب نمایید .

در دوره مصرف دارو از دهانشویه و مسواک مناسب و نخ دندان استفاده نمایید .

### شرایط نگهداری :

دارو را نر جای خشک و خنک و در دمای کمتر از ۳۰درجه نگهداری نمایید .

دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید .

دکتر سید مهدی سجادی ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

