

اطلاعات فاماکولوژی شماره ۳

۱۳۹۴/۰۷/۳۰

آموزش به بیمارانی که داروی زلودا مصرف می کند



- قرصها را تا ۳۰ دقیقه بعد از اتمام غذا (صبحانه یا شام) میل نمایید .
- قرصها باید در هر وعده ی غذا با هم و با یک لیوان خورده شود .
- این دارو در دمای اتاق زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
- در صورت فراموش کردن یک دوز دارو دوز بعدی را دو برابر ننمایید .
- از مصرف همزمان با داروهای گیاهی خودداری کنید .
- در صورت مصرف دارو های دیگر پزشک را در جریان قرار دهید .

عوارض جانبی دارو :

شایعترین عوارض جانبی دارو :

اسهال , بیبوست , تهوع , استفراغ , التهاب مخاط دهان و گلو , درد شکمی , کاهش اشتها .

در صورت بروز هر یک از علائم زیر با پزشک/پرستار خود تماس بگیرید:

اسهال : بیش از یک بار در ۲۴ ساعت

تب یا عفونت : در صورت بروز دمای بالا یا علائم دیگری از عفونت

مشکلات دهانی : بروز قرمزی , تورم , زخم و درد دهان

مشکل در اندام تحتانی : تورم , قرمزی , گزگز در دستها و پاها

دکتر سید مهدی سجادی

