



\*\*\*\*\*

### آزمایشاتی که رژیم دارویی خاص میخواهد

• Aldosterone, Serum or Urine

قبل از انجام آزمایش باید هیپوکالمی اصلاح گردد و در صورت استفاده از داروهای ضد فشار خون و دیوتیک، حداقل از دو هفته قبل (ترجیحاً چهار تا شش هفته قبل) از انجام آزمایش با نظر پزشک قطع گردند.

• Aluminum, Serum or Urine

بیمار نباید از ۲۴ ساعت قبل از آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم مانند آمفوژل یا سرکرافیت استفاده نماید.

• ACE, Serum

کاپتوپریل و انالاپریل باعث کاهش مقادیر سرمی ACE می گردند.

• Catecholamines, Fractionation, Plasma

مصرف داروهایی مانند متیل دوپا و پروپرانولول که شبیه به اپی نفرین و نوراپی نفرین هستند باید یک هفته قبل از انجام آزمایش قطع گردند.

• Cortisol, Serum or Urine

بیمار باید از مصرف اسپیرونولاکتون یا کیناکرین اجتناب کرده و بدون استرس باشد.

• Ferritin, Serum

هنگامی که بیمار تحت درمان با آهن است، تعیین فریتین سرم چندان قابل اعتماد نخواهد بود.

• 5-HIAA, Urine

برای حداقل ۴۸-۷۲ ساعت قبل از نمونه گیری و در طی جمع آوری نمونه، بیمار باید از مصرف داروهای استامینوفن، سالیسیلات ها، فناستین، شربت سرفه حاوی گلیکولات گلیسیرین، ناپروکسن، متوکاربامول، ایمی پرامین، ایزونیازید، مهارکننده های منوآمین اکسیداز (MAOI)، متنامین، متیل دوپا، زرپین و فنوتیازین ها منع شود.

• Homovanillic Acid (HVA), Urine

بیمار باید حتی المقدور ۴۸ ساعت پیش از جمع آوری نمونه آسپرین، دی سولفیرام، زرپین و پیریدوکسین مصرف نکرده باشد. لوودوپا هم باید تا دو هفته قبل مصرف نشده باشد.

• Intrinsic Factor Blocking Antibody

بیمار از یک هفته قبل از آزمایش نباید ویتامین B12 تزریق کرده باشد.

• Oxalate, Urine

از ۲۴ ساعت قبل از جمع آوری نمونه از مصرف ویتامین C اجتناب شود.

• PH, Stool

روش های تشخیصی با باریم و استفاده از مسهل تا یک هفته قبل نباید انجام شده باشند.

• Protein C

مصرف ضد انعقاد خوراکی توسط بیمار سوال شود چرا که سطوح پروتئین C با مصرف وارفارین کاهش می یابد و تا زمانی که بیمار حداقل به مدت ۱۰ روز مصرف وارفارین را متوقف نکرده نباید آزمایش انجام شود.

• Protein S

سطوح پروتئین S با مصرف استروژن یا وارفارین و در طی حاملگی کاهش می یابد و تا زمانی که بیمار حداقل به مدت ۱۰ روز مصرف وارفارین را متوقف نکرده نباید آزمایش انجام شود.