



آزمایشاتی که زمان بندی خاص میخواهد

➤ ACTH,Plasma

جهت اندازه‌گیری‌های متوالی لازم است نمونه‌گیری در روزهای مختلف در یک ساعت ثابت انجام شود. همچنین نمونه‌هایی که برای اثبات وجود ریتم شبانه روزی طبیعی گرفته می‌شوند باید بین ۶ و ۱۰ صبح و بین ۹ شب تا نیمه شب باشند.

➤ AFP, Serum

جهت غربالگری نشانگان داون زمان مطلوب، هفته ۱۶ تا ۱۸ حاملگی است.

➤ Androstenedione, Serum

در زنان نمونه باید یک هفته قبل یا بعد از دوره قاعدگی گرفته شود.

➤ Estriol, Unconjugated, Pregnancy, Serum or Plasma or Urin

جهت غربالگری نشانگان داون و نشانگان ادوارد، زمان مطلوب هفته ۱۶ تا ۱۸ حاملگی است.

➤ Glycated Hemoglobin (HbA1C), Blood

در بیماران مبتلا به دیابت نوع اول آزمایش با فاصله سه ماه توصیه می‌شود. در مبتلایان به دیابت نوع دوم در هنگام تشخیص بیماری و هر شش ماه یا هر گاه که نظارت خوب بر بیماری مورد نیاز باشد درخواست می‌شود.

➤ Inhibin A, Serum

اندازه‌گیری فقط بعد از هفته ۱۴ حاملگی انجام می‌شود.

➤ Iron, Serum

به علت تاثیرات ریتم شبانه روزی آهن و اینکه سطح آهن سرم در عصر پایین‌تر است. نمونه باید در حالت ناشتا و صبح گرفته شود.

➤ Lithium, Serum

نمونه را ۱۲ ساعت پس از مصرف آخرین دوز دارو بگیرید.

➤ Urobilinogen, 2-Hour Urine

از آنجایی که یک پیک واضح در طی روز در دفع آن وجود دارد، بنابراین حالت مطلوب، یک نمونه عصرگاهی خواهد بود.