



راهنمای اسکاچ تست



مراجعه کننده ی محترم با سپاس از حسن انتخاب شما لطفا موارد زیر را جهت تهیه ی نمونه رعایت فرمایید :

۱. به بیمار ۲ عدد لام به اضافه چسب پلاستیکی داده می شود.
۲. بیمار باید به شکم خوابانده و چسب پلاستیکی به قسمت مقعد (رکتوم) چسبانیده و اعمال فشار کمی نوار چسب را به سطح مقعد (رکتوم) تثبیت می نمایم
۳. بعد از ۲۰ الی ۳۰ دقیقه چسب را از محل مقعد (رکتوم) جدا کرده و از محل چسب نوار به سطح لام (شیشه) می چسبانیم .
۴. در صورت موفقیت آمیز نبودن این عمل ، می توانید از لام (شیشه) و چسب اضافی استفاده نمایید و مراحل ۲ الی ۴ را تکرار کنید .
۵. لام (شیشه) چسب خورده را در یک پاکت که مشخصات بیمار در آن ذکر شده به آزمایشگاه تحویل دهید .
۶. بدلیل ضخامت کم شیشه لام ، از ضربه خوردگی لام جلوگیری می شود .
۷. پس از نمونه برداری ، دستهای خود را بشویید .