

اطلاعیه آموزشی فارماکولوژی شماره ۲

۱	نام دارو		فیلگراستیم
۲	دسته دارویی		فاکتور رشد هماتوپوئیتیک
۳	رده درمانی		محرك مغز استخوان
۴	اشکال دارو		Injection:300mcg/ml,1ml,600mcg/ml,0.5ml
۵	موارد مصرف		الف) کاهش ابتلا به عفونت پس از شیمی درمانی در بد خیمی های غیر میلوئیدی، نوتروپنی شدید و مزمن ب) پس از پیوند مغز استخوان در بیماران سرطانی ج) AIDS د) انمی اپلاستیک
۶	عوارض جانبی		-اعصاب مرکزی: خستگی، تب و سردرد -قلبی عروقی: اریتمی، درد قفسه سینه، سکته ی قلبی ،افت فشار خون گذرا -دستگاه گوارش: بیبوست، اسهال، موکوزیت، تهوع ،استوماتیت، استفراغ -خون: لکوسیتوز، ترومبو سیٹو پنی -عضلانی -اسکلتی: درد اسکلتی -تنفسی: سرفه، دیسپنه -پوست: ریزش مو، واسکولیت پوستی، راش -سایر عوارض: واکنش های حساسیتی
۷	ملاحظات اختصاصی		۱-قبل از درمان و هر دو هفته حین درمان CBC بیمار بررسی شود. ۲-درد استخوانی شایع ترین عارضه ی دارو است که در صورت ضعیف تا متوسط بودن می توان ان را با ضد درد های غیر اپیوئیدی بر طرف نمود.

<p>در صورت شدید بودن درد ها می توان از مخدر ها استفاده کرد .</p> <p>۳- واکنش های الرژیک از جمله راش ، بثورات جلدی ،ویز ، دیسپنه ، تاکیکاردی و افت فشار خون با دوز های اول و یا بعدی دارو گزارش شده است .</p> <p>این واکنش ها با تزریق وریدی و ظرف ۳۰ دقیقه اول بیشتر رخ میدهد.</p> <p>۴- توجه شود که تجویز دارو نباید زودتر از ۲۴ ساعت پس از شیمی درمانی و یا ۲۴ ساعت قبل از ان شروع شود .</p> <p>۵- در بیماران مبتلا به انمی داسی شکل می تواند منجر به بروز بحران شود بنابراین مصرف دارو در این بیماران باید دلایل محکمی داشته باشد.</p> <p>۶در مصرف برای بیماریهای میلوئیدی احتیاط شود زیرا دارو می تواند به عنوان یک محرک رشد تومور عمل نماید</p>			
<p>این دارو تا زمان مصرف در دمای ۸-۲درجه سانتی گراد نگهداری شود .</p> <p>از تکان دادن شدید دارو خودداری گردد.</p> <p>از ۲۴ ساعت قبل از تزریق می توان دارو را در دمای اتاق نگهداری نمود .</p>		<p>شرایط نگهداری دارو</p>	<p>۸</p>
<p>دکتر سید مهدی سجادی ۱۳۹۴/۰۷/۲۹</p>		<p>تهیه کننده</p>	<p>۹</p>