



راهنمای تست خون مخفی در مدفوع FOB



- مراجعه کننده ی محترم با سپاس از حسن انتخاب شما لطفا موارد زیر را جهت تهیه ی نمونه رعایت فرمایید :
۱. سه روز قبل از آزمایش و در طی دوره جمع آوری نمونه مدفوع، از خوردن گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ و ماکیان)، ماهی، سلغم و تربچه خودداری کنید.
 ۲. مصرف قرصهای آهن، کپسول هماتینیک و ففول، ایندومتاسین، کلشیسین، آسپرین، بروفن، کورتونها و ویتامین C باید ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش قطع شود.
 ۳. در صورت داشتن سابقه خونریزی از لثه، ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش از مسواک زدن و کشیدن نخ دندان اجتناب نمایید.
 ۴. اگر بیمار بستری است، نمونه را در یک ظرف خشک جمع آوری نموده و سپس با استفاده از چوب مخصوص (آپسلانک)، نمونه را به ظرف برچسب دار منتقل نمایید.
 ۵. صبح مقدار کمی مدفوع (حدود ۵ گرم) در ظرف ریخته و با استفاده از چوبک آن را به داخل ظرف پلاستیکی ریخته و سپس چوبک را دور می اندازید.
 ۶. در طول مدت نمونه گیری ظرف حاوی مدفوع را در محل خنک نگهدارید.
 ۸. نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار می تواند برخی از انگل های فعال را از بین ببرد. بیماران باید نمونه جمع آوری شده را خصوصاً در موارد مشکوک به اسهال خونی بلافاصله به آزمایشگاه ارسال کنند.