

آشنایی با دارو ها (۱)

1394/07/26



آنچه که در باره مروپنم باید بدانیم



الف : مقدار ونحوه ی مصرف :

- ۱- بزرگسالان هر ۸ ساعت نیم تا ۲ گرم انفوزیون وریدی طی ۳۰ دقیقه ویا تزریق اِهسته ی وریدی طی ۵ دقیقه
- ۲- اطفال هر ۸ ساعت ۱۰-۴۰ mg/kg انفوزیون وریدی طی ۳۰ دقیقه یا تزریق اِهسته وریدی طی ۵ دقیقه



ب : نحوه ی آماده سازی و راههای تزریق :

جهت آماده سازی ویال ۵۰۰ میلی گرم ، ۱۰ میلی لیتر اب استریل را اضافه و از تکان دادن و انحلال کامل وشفاف شدن ویال تزریق صورت میگیرد .



برای انفوزیون وریدی پس از آماده سازی اولیه محتویات ویال همراه با محلول سدیم کلراید ۱% یا دکستروز ۵% تا حجم ۵۰ تا ۲۰۰ میلی رقیق شده و تزریق صورت می گیرد .

- ویال های آماده شده در دمای اتاق به مدت ۲ ساعت و در یخچال ۱۲ ساعت قابل نگهداری است .



- در صورت مصرف داروی سدیم والپرات احتیاط لازم است .

- در صورت بروز اسهال شدید سریعاً پزشک را مطلع سازید .



دکتر مهدی سجادی :مسئول فنی داروخانه

