



بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیمارستان سیدالشهداء (ع)

کد: TA/MM/24/R:0

تاریخ تدوین: دی ۹۵

تاریخ ابلاغ: بهمن ۹۵

تاریخ بازنگری: دی ۹۶

صفحه: ۱/۱

لیست داروهای خود به خود متوقف شوند (Auto stop Orders)

داروهای خود به خود متوقف شونده به داروهایی گفته می شود که پس از مدت زمان معینی دیگر نباید ادامه یابند و باید به پزشک معالج اطلاع داده شود.

ادامه دستورات دارویی معمولاً در موارد روبرو خود به خود متوقف می شوند:	
۱- انتقال بیمار از یا به بخش ICU	
۲- انتقال بیمار از یا به بخش دیگر	
۳- فرستادن بیمار به قسمت ترخیص	
۱- ضدقارچ های وریدی بعد از ۱۴ روز	
۲- داروهای ضد اسهال بعد از ۳ روز	
۳- داروهای ضد یبوست بعد از ۱۴ روز	
۴- ضد میکروب ها (بجز داروهای موضعی) بعد از ۷ روز	
۵- ضد تشنج ها بعد از ۷۲ ساعت	
۶- کورتیکواستروئیدها (بجز داروهای موضعی) بعد از ۷ روز	
۷- داروهای ضد اضطراب و اختلال روانی بعد از ۱۴ روز	
۸- داروهای خواب آور بعد از ۱۴ روز	
۹- مخدرها (بجز متادون) بعد از ۷ روز	
۱۰- محلول های استنشاقی بوسیله نوبولایزر بعد از ۷ روز	
۱۱- تمامی داروهای تغذیه ای غیر خوراکی بعد از ۷ روز	
۱۲- تنگ کننده عروق (چشمی و بینی) بعد از ۳ روز	
۱۳- NSAID و مهارکننده های COXII بعد از ۱۰ روز	
۱۴- کورتیکواستروئیدهای چشمی و خوراکی بعد از ۷ روز	
۱۵- ضدقارچ های موضعی بعد از ۳۰ روز	
۱۶- داروهایی که دستور مصرف آنها در مواقع الزام و ضرورت است در صورت عدم دستور جدید بعد از ۲۸ روز	
۱۷- کرم ها، پمادها و لوسیون های موضعی حاوی کورتیکواستروئیدها بعد از ۲۸ روز	
۱۸- مولتی ویتامین ها، ضد اسیدها (ALMg-Mgoh2) و استامینوفن بعد از ۳۰ روز	
۱۹- زمانی که بیمار به بخش جراحی انتقال می یابد تمامی داروها متوقف می شوند.	

فهرست داروهایی که بعد از مدت معینی باید متوقف شوند: