


جمهوری اسلامی ایران

سرطان کبد BR/EP/094



واحد آموزش همگانی

تاریخ تولید: تیرماه ۹۶

تاریخ بازنگری :-

متاستاز کبدی

بیشتر متاستازهای کبدی از کولون شروع شده و به کبد سرایت می‌کنند. در واقع، سرطان کولورکتال اغلب به متاستاز کبدی منجر می‌شود. از علائم آن می‌توان به مواردی چون بی‌اشتهایی، تب، زردی و تهوع اشاره کرد. انجام عمل جراحی به منظور از میان برداشتن تومورهای کبد (اغلب با شیمی درمانی همراه است). از مؤثرترین روش‌های درمانی برای بیماران مبتلا به متاستاز کبدی ناشی از سرطان کولورکتال می‌باشد.

منابع:

برونر، سودارث، پرستاری بیماری‌های کبد و مجاری

صفراوی ۲۰۱۵

لاکمن، سورنس، پرستاری بیماری‌های کبد و مجاری

صفراوی ۲۰۱۳

تدابیر طبی:

درمان سرطان کبد (سرطان اولیه کبد) به سطح بیماری و همچنین سن، سلامتی کلی و اولولیت‌های فردی بستگی دارد. روش‌های درمانی مخصوص سرطان اولیه کبد از قرار زیر هستند:

- ◀ جراحی برداشتن قسمتی از کبد
- ◀ جراحی پیوند کبد
- ◀ منجمد کردن سلول‌های سرطانی
- ◀ گرم کردن سلول‌های سرطانی
- ◀ تزریق الکل به تومور
- ◀ پرتودرمانی
- ◀ دارودرمانی هدفمند
- ◀ شیمی درمانی



مقدمه

سرطان کبد عبارت است از یک تومور بدخیم (سرطانی) که از بافت کبد منشأ می‌گیرد. البته سرطان‌های کبدی نیز یافت می‌شوند که از نقاط دیگر منشأ گرفته به کبد گسترش یافته‌اند سرطان کبد معمولاً در ارتباط با یک بیماری زمینه‌ای در کبد مثل سیروز کبد رخ می‌دهد. این سرطان در هر دو جنس به وجود می‌آید، اما در مردان شایع‌تر است.

علل:

- ⇐ سیروز
- ⇐ هپاتیت C و B
- ⇐ مواجهه مستقیم با مواد شیمیایی و سمی
- ⇐ سیگار کشیدن
- ⇐ نوشیدن الکل
- ⇐ متاستاز از نواحی دیگر

تظاهرات بالینی:

- تهوع و استفراغ
- کاهش وزن بدون دلیل
- کاهش اشتها
- درد بالای شکم
- ضعف عمومی و خستگی
- ورم شکم
- تغییر رنگ پوست
- زرد شدن چشم‌ها
- تغییر رنگ مدفوع به سفید



یافته های تشخیص:

- ⇐ علایم بالینی
- ⇐ معاینات جسمی
- ⇐ نتایج آزمایشگاهی
- ⇐ رادیوگرافیک
- ⇐ توموگرافی
- ⇐ اسکن کبد
- ⇐ سی تی اسکن
- ⇐ ام آر آی
- ⇐ لاپاراسکوپی
- ⇐ بیوپسی

