


جمهوری اسلامی ایران  
سازمان آموزش و پرورش

## زندگی با کیسه کلستومی

کد: GCC-PA-054/08



### آموزش همگانی

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

### مسافت:

- ◊ برای مسافت کردن هیچ محدودیتی وجود ندارد.
- ◊ تعداد کافی کیسه های کولستومی و وسایل آن را به همراه داشته باشید.
- ◊ برای پیشگیری از چسبیدن کیسه به بدن از یک پارچه یا مخصوص برای پوشاندن پوست زیر کیسه استفاده کنید.
- ◊ گرما یا سرمای زیاد باعث خراب شدن کیسه ها خواهد شد.

### در موقع زیر پزشک خود را مطلع کنید:

- => نفخ و تورم شکم
- => تغییر رنگ محتويات داخل کیسه کولستومی
- => دل پیچه شدید(بیش از ساعت)
- => ترشحات آبکی شدید از کولستومی که بیش از ۶ ساعت طول کشیده باشد
- => عدم خروج مواد دفعی از کولستومی طی ۳ روز گذشته
- => ورم کردن ناحیه کلستومی
- => آزردگی شدید پوست و یا زخم های عمیق
- => کشیده شدن کولستومی به داخل از سطح پوست

### منبع:

برونر.سودارت،پرستاری بیماری های گوارش

### رزیم غذایی:

- ◊ یک رژیم غذایی متعادل داشته باشید.
- ◊ غذا را خوب بجوید.
- ◊ روزانه حداقل ۸-۶ لیوان آب بخورید.
- ◊ از جویدن آدامس، سیگار کشیدن و نوشیدن مایعات از طریق نی خودداری کنید



◊ خوردن ماست و دوغ به کاهش گاز تولیدی کمک میکند.

◊ غذاهایی مانند پیاز، ماهی، کلم بروکلی و سیر و کلم باعث تولید بوی بیشتری می شوند.

### مسائل جنسی

- => با همسر خود در مورد احساسات صحبت کنید.
- => از سایز کوچکتر کیسه و یا مینی کیسه های مخصوص استفاده کنید.

## کولستومی چیست؟

کولستومی سوراخی است که توسط جراح برای خروج مدفع از جدار شکم ایجاد می‌شود. سپس مدفع در یک کیسه قابل تعویض که توسط چسب به جدار شکم متصل می‌شود، ریخته می‌شود.

## تعویض کولستومی

- ◊ سایز کیسه را متناسب با سایز محل کولستومی انتخاب کنید.
- ◊ بهترین زمان برای تعویض کیسه قبل از خوردن صبحانه می‌باشد.
- ◊ بهتر است زمانی که یک سوم کیسه پر شده است، اقدام به خالی کردن آن بکنید.
- ◊ هر زمان که کیسه دچار نشت شود یا پوست زیر آن شروع به خارش یا سوزش نماید، کیسه باید تعویض شود..
- ◊ بهترین حالت تعویض در حالت ایستاده است.
- ◊ پوست اطراف کولستومی را هنگام تعویض کیسه بررسی کنید
- ◊ از کیسه‌های ضدبو استفاده کنید.

## داروها

=> لیستی از داروهای خود را همراه خود داشته باشید.

=> اگر داخل کیسه کولستومی قرصهای خود را دیدید حتماً پزشک خود را مطلع کنید.

=> هیچگاه از ملین و مسهل استفاده نکنید

=> پزشکان را نیز از وجود کولستومی مطلع کنید

=> از آسپرین برای کاهش بوی کیسه استفاده نکنید.

## ورژش کردن


=> پیاده روی کنید.

=> از انجام ورزش‌های سنگین اجتناب کنید..

## شستشوی استومی

♦ کاتتر را ۱۰ سانتیمتر وارد کرده که هم نشت نکند و هم روده

را شستشو دهد



## هر اوقیت از پوست ناحیه

◊ موی اطراف کولستومی را بتراشید.

◊ از آب و صابونهای ملایم و بدون عطر برای تمیز کردن

پوست اطراف کولستومی استفاده کنید..

◊ اگر پوست ناحیه دچار التهاب شد :

=> کیسه را به آرامی بردارید

=> پوست را با پارچه خیس به آرامی تمیز نماید.

=> روی محل التهاب پودر مخصوص محافظت از استومی

بپاشید و سپس آن را پاک کنید

=> از پوشیدن کمربندهای بسیار سفت یا نوارهای کمری

محکم خودداری کنید.

=> کیسه جدید را وصل کنید.

## حمام کردن

◊ حین حمام کیسه کولستومی میتواند باز یا بسته باشد.

◊ آب و صابون وارد کولستومی نشود.

