



پیشگیری از خونریزی در کودکان

GCC-PA-076/10



واحدآموزش همگانی

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

هشدار:

هرگونه سردردتغییر در سطح هوشیاری کودک را به پزشک اطلاع دهید.
قبل از انجام هر اقدام دندانپزشکی با پزشک معالج مشورت کنید.



منابع:

- ◇ برونر.سودارث، بیماری سرطان
- ◇ مارلو، بیماریهای اطفال

◇ محل تزریق را از نظر وجود خونریزی کنترل کنید.

◇ بعد از انجام کارها ئی مانند کشیدن دندان، آزمایش خون، واکسیناسیون، خروج برانول از رگ کودک، خونریزی را با فشار ملایم بند بیاورید و به خونریزیهای احتمالی توجه کنید.

◇ هرگونه تغییر در رنگ و قوام مدفوع، خلط و ادرار بیمار را گزارش کنید.

◇ خونریزی از لثه، افزایش کبودی و خونمردگی را گزارش دهید.



والدین گرامی:

کودک شما برای درمان بیماری فعلی نیاز به دارو دارد و همانطور

که میدانید هر دارویی عوارضی به دنبال دارد.

داروهای شیمی درمانی ممکنست روی پلاکتهای خون که در

مغز استخوان ساخته میشوند و نقش مهمی در انعقاد خون و

جلوگیری از خونریزی دارند اثر گذارند. با کاهش تعداد پلاکتهای

خون احتمال بروز خونریزی در کودکان بیشتر میشود.

در اینصورت رعایت نکات زیر برای کاهش

خطر خونریزی لازمست:

♦ برای نرم نگهداشتن پوست بدن از کرم و لوسیونهای

بهداشتی استفاده کنید.

♦ کودک را در مقابل ضربه و جراحت محافظت کنید.

♦ به او یاد دهید با در نظر گرفتن موارد ایمنی فعالیت بدنی

داشته باشد.

♦ ایمنی محیط اطراف کودک را افزایش دهید:

I. همیشه نرده های کنار تخت بالا باشد.

II. در جابجائی ها به او کمک کنید

III. هرگونه مانعی که موجب سقوط و زمین خوردن میشوند باید

برداشته شوند

IV. شب خواب روشن باشد



♦ هوای اتاق کودک را مرطوب نگه دارید.

♦ از او بخواهید انگشت به درون بینی نبرد.

♦ از گذاشتن درجه حرارت، استعمال شیاف و تنقیه در مقعد

خودداری کنید.

♦ برای کودک مسواک بسیار نرم تهیه کنید و لثه هایش را با پنبه

به آرامی تمیز کنید.

در صورتیکه دچار خون دماغ شد

I. او را در حالت نشسته قرار دهید.

II. سر او را به جلو خم کنید.

III. سوراخهای بینی او رافشار دهید.

IV. روی پل بینی او کمپرس سرد قرار دهید.

اگر طی ۵ دقیقه خونریزی او بند نیامد و مقدار آن زیاد بود، به

پزشک معالج اطلاع دهید.