

پدرستان پیدائشہاء (ع)

سرطان روده بزرگ GCC-PA-008/12



واحد آموزش همگانی

آخرین تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۱/۱۵

درمان:

انواع مختلفی از درمان برای بیماران مبتلا به سرطان روده

بزرگ وجود دارد.

- جراحی
- شیمی درمانی
- پرتودرمانی
- هدف درمانی

پیگیری:

بعضی از آزمایش‌ها که برای تشخیص سرطان یا آگاهی

از مرحله سرطان انجام می‌شوند، ممکن است جهت ارزیابی

چگونگی اثربخشی درمان تکرار شوند. تصمیمات درباره

ادامه، تغییر یا توقف درمان مبنی بر نتایج این آزمایش‌ها

باشد.

منابع:


برونر-سودارث، بیماری‌های دستگاه گوارش

فیس، بیماری‌های دستگاه گوارش

روش‌های مورد استفاده در روند مرحله بندی

روشهای رادیولوژیک شامل:

- گرافی ساده
- سی تی اسکن
- ام. آر. آی
- نمونه برداری غدد لنفاوی و نواحی مشکوک به درگیری
- آزمایشات دوره ای تخصصی



احتمال بهبودی به موارد زیر وابسته است

- مرحله سرطان
- ایجاد انسداد یا پارگی در روده بزرگ
- آزمایشات خونی
- عود سرطان
- سلامت عمومی بیمار و بیماری‌های زمینه ای

مقدمه

کولون و رکتوم قسمتهائی از روده بزرگ هستند که قسمتی از دستگاه گوارش به حساب می آیند. کولون حدود ۱ تا ۱,۵ متر ابتدای روده بزرگ، و رکتوم چند سانتی متر انتهایی آن است.


سرطان روده بزرگ بیماری است که در آن سلول های بدخیم (سرطانی) در بافت روده بزرگ شکل می گیرند.

عوامل خطرزا:

- سن ۵۰ سال یا بالاتر
- سابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ
- سابقه شخصی یا خانوادگی سرطان روده بزرگ، راست روده، تخمدان، رحم یا پستان
- سابقه داشتن پولیپها در روده بزرگ در فرد یا فامیل
- سابقه کولیت
- رژیم غذایی حاوی مقدار زیادی گوشت قرمز
- داشتن اضافه وزن (چربی اضافی دور کمر)
- کشیدن سیگار یا نوشیدن مشروبات الکلی
- کم تحرکی

علائم:

- تغییر در عادات اجابت مزاج
 - خون در مدفوع
 - مدفوع باریک تر از معمول
 - گاز معده توأم با درد مکرر
 - نفخ، احساس سیری یا درد شکم
 - کاهش وزن به دلیل ناشناخته
 - احساس خستگی زیاد
 - تهوع
 - بی اشتتهائی
 - بیرقان و زردی پوست یا سفیدی چشم
- برای پیدا کردن پولیپها یا سرطان کولورکتال در مراحل ابتدایی افراد در دهه ۵۰ سالگی و مسن تر و نیز افراد با سابقه فامیلی بدخیمی ها باید غربالگری شوند.



تشخیص:

- گرفتن سوابق بیمار و سوابق فامیلی
- معاینه فیزیکی
- آزمایش خون
- آزمایش خون پنهان در مدفوع



- معاینه مقعد با انگشت
- بررسی رادیولوژیک
- تنقیه باریوم
- نمونه برداری

پس از این که سرطان روده بزرگ تشخیص داده شد، آزمایش برای آگاهی از انتشار سلول های سرطانی در روده بزرگ یا بخش های دیگر بدن انجام می شوند.