

پستبان سیدالشهدا (ع)

## جراحی سرطان پستان

کد: GCC-PA-055/08



آموزش همگانی

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

### عوارض بعد از جراحی

ممکن است بعد از جراحی پستان برخی از عوارض

بروز کنند که لازمست در صورت بروز آنها

بلافاصله با پزشک خود مشورت کنید تا اقدام مناسب

جهت رفع آنها انجام شود

### عوارض کوتاه مدت جراحی

← عفونت زخم

← تجمع خون در محل زخم

← تجمع مایع شفاف در محل زخم

### عوارض دراز مدت جراحی

◇ درد

◇ لنف ادم یا تورم دست

علائم زیر را فوراً گزارش دهید:

◇ تب بالاتر از ۳۸/۷

◇ قرمزی سطح برش جراحی

◇ ترشحات غیر معمول از برش جراحی

◇ افزایش شدت درد

◇ احساس تجمع مایع زیر پوست

### منابع:

برونر. سودارت، بیماری های زنان

### نکات مهم:

◇ درن ها معمولاً بعد از روهفتم کشیده خواهند شد.

◇ بخیه های قابل جذب استفاده نیازی به برداشتن ندارند.

◇ تا ۴۸ ساعت بعد از خارج کردن این لوله ها از حمام رفتن پرهیز کنید.

◇ داروهای مسکن و احياناً آنتی بیوتیک تجویز شده از سوی پزشک معالج را تا آخر مصرف کنید.

◇ بهتر است حرکات خفیف دست زودتر آغاز شود.

◇ این کار همراه با درد خفیف خواهد بود آنرا تحمل کنید.

◇ اگر احساس درد دارید، درخواست داروی ضد درد کنید.


◇ پس از جراحی استراحت کنید و توان خود را بازیابید.



## مقدمه:

جراحی در تشخیص و درمان اکثر سرطانهای پستان اهمیت دارد. اغلب زنان مبتلا به سرطان پستان، باید تحت عمل جراحی قرار گیرند. نوع عمل جراحی به عوامل مختلفی بستگی دارد. و انتخاب درمان های سنگین تر مثل برداشتن تمام پستان، الزاماً به معنی پیشرفته بودن بیماری نیست.

در جراحی سرطان پستان تومور پستانی و غدد لنفاوی زیر بغل باید بطور جداگانه مورد توجه قرار گیرد.



## انواع جراحی پستان

### ۱) ماستکتومی

برداشته کامل پستان

### ۲) لامپکتومی (جراحی حفظ پستان)

برداشتن تومور اصلی به همراه حاشیه ای از بافت

نرمال پستان

### ۳) ربع برداری

برداشتن یک چهارم از پستان که سرطان در آن وجود دارد.

### ۴) تخلیه گره های لنفاوی زیر بغل

با تخلیه این گرهها تومور را مرحله بندی کرده و نیاز احتمالی به شیمی درمانی را مشخص می کنند.

نکته اساسی اینست که جراح در روش ماستکتومی

ولامپکتومی تعدادی از غدد لنفاوی زیر بغل را به

منظور بررسی وجود بیماری میکروسکوپی در غدد

لنفاوی خارج می کند. اطلاع از ابتلا یا عدم ابتلا غدد

لنفاوی زیر بغل نقش بسیار با اهمیتی در طراحی

درمان آینده خواهد داشت.

## قبل از عمل جراحی

\* از شب قبل از عمل (۱۲-۱۰ ساعت) ناشتا باشید.

\* متخصص بیهوشی شما را ویزیت می کند.

\* در صورت سابقه بروز مشکل حین بیهوشی برای خود یا خانواده آن را با متخصص بیهوشی در میان بگذارید.

## علائم بعد از عمل جراحی

\* کمی احساس گلو درد

\* گجی بعد از بیهوشی

\* احساس کرختی و خارش یا درد در قفسه سینه

، سطح داخلی بازو و یا شانه

## مراقبت های بعد از عمل

برخی جراحان ترجیح می دهند بیمار را تا خارج

کردن درنهای معمولاً تا یک هفته (در بیمارستان

تحت نظر بگیرند. ممکنست شما با پانسمان و یک یا

دو درن از بیمارستان مرخص شوید.